



Przychodnia Weterynaryjna Dr HAU
Paweł Mucha, Jarosław Przygórzewski s.c.
ul. Mała Góra 71A
30-864 Kraków
Telefon: 12/658-00-72; 505454108
E-mail: w etdrhau@gmail.com

Zwierzę

Kalbi

Gatunek: Pies
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samiec
Wiek: 1 rok i 10 miesięcy
Oznakowanie:
Maść: ruda

Właściciel

Janas Dominika

ul. Krowoderskich Zuchów 178
38-400 Kraków

Telefon: 531177540

Lekarz prowadzący: Jarosław Przygórzewski

Karta informacyjna wizyty

26/10/2017 23:35: Badanie

Opis badania:

Pacjent skierowany z innego ZLZ z potwierdzonym radiologicznie złamaniem kręgosłupa w odcinku piersiowym .
Przemieszczenie nastąpiło pomiędzy kręgami Th12-Th13. Pacjent z zachowanym czuciem bólu głębokiego, odruchami odciągania i rzepkowym. Podejmował próby pionizowania i przemieszczania.
Wykonano stabilizację za pomocą gwoździ gwintowanych 4szt, dwóch gwoździ Kirschnera 1.2 oraz cementu kostnego. Zdjęcia RTG po operacji wykazały prawidłową linię przebiegu kanału kręgowego.
Diagnoza: Stabilizacja złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym(Th12-Th13).

Zabiegi

[Materiały jednorazowe](#)
[Materiały chirurgiczne 3](#)
[Znieczulenie wziewne](#)
[Zabieg chirurgiczny_2](#)
[Rtg 4](#)

Zastosowane leki

Sedator, roztw.do wstrz., 10 ml 0,2 ml
Midanium, 5 mg/1 ml, inj., 10 amp 0,4 amp
Propofol 3 ml
Iso-vet 250ml pl 0,05 Szt
Solutio Ringeri Lact.Fres,r-r d/inf, 500 1000 ml
Solu Medrol, 250mg, prosz, rozp.ds.r.d/wstrz, 1f.+rozp 1 opa
Controloc, 40 mg, prosz.d/sp.rozt.do wst 1 op
Fentanyl WZF, 0,5 mg/10 ml, inj., (Polfa 14 ml

Zalecenia:

- OGRANICZENIE RUCHU tzw. reżim klatkowy na okres 4-12 tygodni w zależności od rozwoju stanu pooperacyjnego, spacer w celu toalety ok.10min na krótkiej smyczy
 - kontrola 3 dni po wydaniu pacjenta
 - usunięcie szwów 10-14 dni po zabiegu
 - antybiotyk 7-14 dni po zabiegu np. Clavaseptin 250mg 0,5 tabl co 12 godz
 - leki p/bólowe 7-28 dni po zabiegu np. Onsior 20mg 1tabl co 24 godz lub Cimalgex 30mg 0,5 tabl co 24 godz oraz Tramal 50 mg 1 tabl co 12 godz
 - fizjoterapia - gabinet zoofizjoterapii - www.nacztereclapach.pl
- Możliwe powikłania:
- obrzęki, krwiaki
 - infekcja rany, kości
 - przemieszczenie/złamanie implantów kostnych

-uszkodzenie rdzenia i związane z tym porażenie pacjenta
-utrata stabilizacji złamania
Zarejestrował: Paweł Mucha

Podpis lekarza weterynarii